

VERDÜNNUNGSTABELLE



Beta isodona[®]

Das Original. Von Mundipharma.

Betaiodona® - bitte verdünnen Sie wie folgt:

(Die Angaben entsprechen klinischen Erfahrungsberichten)

Anwendungsgebiet	Verdünnung	zum Beispiel
Vaginalspülung	1 : 25	4 ml auf 100 ml*
IUP Insertion	unverdünnt für Pinselung	-
	1 : 25 für Spülung	4 ml auf 100 ml*
Perinealbereich	1 : 25	4 ml auf 100 ml*
Verbrennungen und andere oberflächliche Wunden	unverdünnt	-
Chronische und postoperative Wunden	1 : 2 – 1 : 20	50 – 5 ml auf 100 ml*
Orthopädie und Traumatologie	1 : 10	10 ml auf 100 ml*
Kieferchirurgie	1 : 10	10 ml auf 100 ml*
Ophthalmologie	1 : 8	(bitte spezielle Rezeptur anfordern)
Bei postexpositioneller Prophylaxe nach HIV-Exposition	1 : 2	5 ml auf 10 ml**
Urologie	unverdünnt zur Antiseptik vor Katheterisierung	-
	1 : 25 für Spülung	4 ml auf 100 ml*
Bäder		
Sitz- und Teilbad Präoperatives Bad	1 : 25	40 ml auf 1 L
	1 : 100	10 ml auf 1 L

*Verdünnungen (mit Wasser, physiologischer Kochsalzlösung oder Ringerlösung) sollen erst bei Bedarf hergestellt und alsbald verbraucht werden

**Verdünnung möglichst mit Phosphatpuffer pH 6,88

